Douce noire de Savoie
Vass4R12s311-315



Collection Vassal-Montpellier

157Mtp18

Anather water the Salar State of the State o

Douce nouve de Savoie (= Corbian) 4 R12 A3M.315

daatiinka daatiin ka daatii daa ka daa k Juntumburb

No d'ordre :

2

Désignation: Donce moire de Savaie = Glean

Emplacement: 4 A 12 3341.345.

THE BOURGEONNEMENT

Epanoui (82) - m ven 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - selenx 186 - veloute 187 - aranéeux 188 - duvetoux 189 ootomeur (197) - sans villosits pubascente (278) - sans villosits laineuse 279.

Blanc (91) - faure ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé (194) jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - enblègement bronzé ou cuivre 197 vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etales - en gouttière - metros.

Face inférieure glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 -

aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotomeuses 200 - sans villocité pubescente (280) sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches (6) - fauves ou rousses 206 - carminées 201 à liséré carmina 208 - jaune (19) - à plages bronzées ou outurées (10) entièrement brouzées ou ouivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas on la première fontille détachée est à lisées carminé, la couleur de la 20me et de la 30me feuille détachées mere notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieur

Nervures : glabro 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duvetoux (718)- cotonneux 219 - sans villasité pubemente (242)sand villosité laineuso 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224) - cotonneux 225 - sans willosita puhescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbo plan - en gouttière - involuté - révaluté - tourments.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte(233)

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villocité pubascente (286) - sans villosité laineuse 287.

Totaloment - sillon - partiellement.

N° d'ordre :

Désignation: Douce voire de Savaie : Carbeau

Emplacement: 4R12 1.311.315.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253,

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune (26) - rouge clair (262) - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

5 C 97

Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année: 1998

Code cépage

0157

Code clone: 18 Nom cépage: Douce moire de Savoire /: Corbeau

Observateur: Lacombe

Emplacement: 4 Res & 341_ 315

Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite(3) - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 réniforme 5

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2) - cinq 3) - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 3 - vert foncé 7

oiv 070 pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe : nulle D- point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigm. antho. nerv. face inf. limbe: nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 072 gaufrure limbe (entre nervures II et III) : absente 1)- présente 9.

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I et II) : absente 1 - présente 9

oiv 074 profil: plan 1- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

oiv 075 cloqure face supérieure limbe : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible (3)moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 -

movenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3)-

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible (1) faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087* densité poils dressés face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente (1) - présente 9. oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1) - présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 7 faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court 1 - plus court(3) égal 5 plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 -

Couleur du pétiole : vert 178 - partiellement coloré 177 - coloré (176)

Formulaire de description 5/8 (maturité)

Année : 1998

Code cépage : 0157

Inntuntuut.

Code clone: 18

Nom cépage: Douce noire de Savire (-Corbeau)

Emplacement: 4 Re 2,3 34-315

Observateur: Lacombe

Grappe

oiv 202 **longueur**: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.

oiv 203 largeur : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3- moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9

oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9

oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm)(3)- moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1) moitié 5 - plus de la moitié 7.

oiv 208* forme : cylindrique(1)- conique ou pyramidale 2.

oiv 209* présence d'un aileron : absent 1) une aile 2) deux ailes 3 - plus de deux ailes 4

Baie

oiv 220 longueur : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 3 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9.

oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9.

oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3)

oiv 223 forme: aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8.

oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6)

oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2)

oiv 227 pruine: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 228 épaisseur pellicule: très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9

oiv 229 ombilic : peu apparent(1) apparent 2

oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée D- colorée 2.

oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée(1)- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9.

oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2)

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.

oiv 236 saveur : aucune D- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5

oiv 236* saveur : aucune(1)- goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.

oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm)(1 - court (4-8mm)(3) - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9.

oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3

oiv 242 longueur pépins: très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. 6-2 mm

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes (1) présentes 2.

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année: 1999

Code cépage :

Code clone: 18 Nom cépage: Donce moire de Savoie (= Corbeau) Observateur

Emplacement: 4 RA2 A311_ 315

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3- aplatie 5 oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée (3)

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtro 2)- rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des nocuds : absence () présence () oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds absence présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (=60mm) 1 - courts (90mm) 3 moyens (120mm) 5 longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9. oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (5mm) 1 - petit (8mm) 3) moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (~17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9 oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 élevé 7 - très élevé 9

Vassal

Noeuds: aplatis 1 - moyens(2)- saillants 3

viguen 2 pruine 3